












Knowledge grows

# Lauko daržovių tręšimo technologijos

	Prieš sodinimą ar sėją	Papildomas tręšimas (dirvožemio)		Tręšimas per lapus***							
	<b>YaraMila COMPLEX</b> 12-11-18 arba <b>CROPCARE</b> 11-11-21	<b>YaraLiva TROPICOTE</b>	<b>YaraLiva NITRABOR</b>	<b>YaraTera KRISTALON</b> 13-40-13 <b>YELLOW</b> 3 kg/ha	<b>YaraVita BRASSITREL PRO</b> 3 l/ha	<b>YaraTera KRISTALON</b> 18-18-18 <b>SPECIAL</b> 3 kg/ha	<b>YaraTera KRISTALON</b> 12-12-36 <b>RED</b> 3 kg/ha	<b>YaraTera CALCINIT</b> 5 kg/ha	<b>YaraTera TENSO COCKTAIL**</b> 0,5 kg/ha	<b>YaraVita MANTRAC PRO</b> 0,5 l/ha	
	Žiediniai kopūstai	600* kg/ha	250 kg/ha Praėjus 2-3 savaitėms po sėjos	250 kg/ha Praėjus 4-5 savaitėms po sėjos	Sudygus	Praėjus 3-4 savaitėms po sėjos	1-2 kartus intensyvaus lapų augimo metu	Formuojantis galvutei 2 kartus kas 10 dienų, pakaitomis su YaraTera CALCINIT	Formuojantis rozetei 2-6 kartus kas 10 dienų	Profilaktiškai, siekiant išvengti mikroelementų trūkumo	-
	Brokoliai	500* kg/ha	200 kg/ha Praėjus 2-3 savaitėms po sėjos	200 kg/ha Praėjus 4-5 savaitėms po sėjos	Sudygus	Praėjus 3-4 savaitėms po sėjos	1-2 kartus intensyvaus lapų augimo metu	Formuojantis galvutei 2 kartus kas 10 dienų, pakaitomis su YaraTera CALCINIT	Rozetės formavimosi pradžioje 2 kartus kas 10 dienų	Profilaktiškai, siekiant išvengti mikroelementų trūkumo	-
	Kopūstai	600* kg/ha	150 kg/ha Praėjus 3 savaitėms po sėjos	Po 150 kg/ha Praėjus 5 ir 7 savaitėms po sėjos	Sudygus	Praėjus 3-4 savaitėms po sėjos	1-2 kartus intensyvaus lapų augimo metu	Esant 20 proc. galvutės dydžio, 3 kartus kas 5-7 dienas, pakaitomis su YaraTera CALCINIT	Esant 20 proc. galvutės dydžio, 3 kartus kas 5-7 dienas	Profilaktiškai, siekiant išvengti mikroelementų trūkumo	Po tarpueilių apdorojimo
	Kininiai kopūstai	500-700 kg/ha	-	Po 150-200 kg/ha Praėjus 3 ir 5 savaitėms po sėjos	Sudygus	Praėjus 3 savaitėms po sėjos	1-2 kartus intensyvaus lapų augimo metu	-	4 savaitės po persodinimo, 5-6 kartus kiekvieną savaitę	Profilaktiškai, siekiant išvengti mikroelementų trūkumo	5 savaitės po pasodinimo
	Morkos	550-800 kg/ha	150-250 kg/ha Esant 4-6 tikriems lapeliams	-	Esant 2-3 tikriems lapeliams	Esant 4-6 tikriems lapeliams	1-2 kartus intensyvaus lapų augimo metu	Esant 10 lapelių 2 kartus kas 10-14 dienų	-	Profilaktiškai, siekiant išvengti mikroelementų trūkumo	-
	Petražolės	550-650 kg/ha	150-200 kg/ha Esant 4-6 tikriems lapeliams	-	Esant 2-3 tikriems lapeliams	Esant 4-6 tikriems lapeliams	1-2 kartus intensyvaus lapų augimo metu	Esant 10 lapelių 2 kartus kas 10-14 dienų	-	Profilaktiškai, siekiant išvengti mikroelementų trūkumo	-
	Porai	600 kg/ha	200 kg/ha Praėjus 4-5 savaitėms po sėjos	Po 150-200 kg/ha Praėjus 2-3 ir 6-7 savaitėms po sėjos	Sudygus	Praėjus 4-5 savaitėms po sėjos	1-2 kartus intensyvaus lapų augimo metu	Stiebų storėjimo metu 2 kartus kas 10-14 dienų	Pageltus lapų galams	Profilaktiškai, siekiant išvengti mikroelementų trūkumo	Išaugus 7 tikriesiems lapeliams
	Salierai	600* kg/ha	150-200 kg/ha Praėjus 3 savaitėms po sėjos	150-200 kg/ha Praėjus 4-5 savaitėms po sėjos	Sudygus	Praėjus 4-5 savaitėms po sėjos	1-2 kartus intensyvaus lapų augimo metu	Šaknų vystymosi metu 3 kartus kas 2 savaites, pakaitomis su YaraTera CALCINIT	Šaknų augimo metu, 3 kartus kas 2 savaites	Profilaktiškai, siekiant išvengti mikroelementų trūkumo	-
	Burokai (raudonieji)	600* kg/ha	-	Po 150-200 kg/ha Praėjus 2 savaitėms po sėjos ir pakartotinai dar po 4 savaitių	Esant 2-3 tikriems lapeliams	Praėjus 6 savaitėms po sėjos	1-2 kartus intensyvaus lapų augimo metu	Šaknų vystymosi metu	-	Profilaktiškai, siekiant išvengti mikroelementų trūkumo	Praėjus 7 savaitėms po sudygimo

\* Visoms lauko daržovėms (išskyrus kininį kopūstą), burokėliams ir salierams papildomai naudokite **YaraMila NPK (S) 7-20-28 (8)** 200 kg (brokoliai) arba 250 kg (žiediniai kopūstai, gūžiniai kopūstai, burokėliai, salierai).

\*\* Dirvožemiams, kuriems trūksta arba labai trūksta kalio, prieš sėją ar sodinimą papildomai naudokite kalio sulfatą, granuliuotą, 50-100 kg/ha pavasarį arba kalio chloridą rudenį. Ypač svarbu naudoti dirvožemiams, kurių aukštas pH; 2-3 kartus per sezoną, galima naudoti kartu su **YaraTera CALCINIT**.

\*\*\* Nešakninių purškimų negalima atlikti intensyviai šviežiant saulei, esant neįprastai aukštai ar neįprastai žemai temperatūrai ar purkšti vystančius augalus. Vandens kiekį pasirinkite pagal augalo lapų skaičių, dydį, augalų kiekį hektare.

Dėmesio: programoje nurodytos dozės yra rekomendacinės, jas reikia koreguoti, remiantis dirvožemio ir augalų analize. Tręšiant reikia atsižvelgti į oro sąlygas ir daigo būklę.

Nepamirškite, kad gausių daržovių derlių galima pasiekti gerai įdirbtame aukšto agrotechninio fono dirvožemyje.